



Séances d'info VITI^{plus} hiver


Sélection des phytos et l'outil BasePhyto

Office de conseil viticole
Florian Favre, Axel Jaquerod et Estelle Pouvreau
viticulture@prometerre.ch
info@vitiplus.ch



BasePhyto
Productivité

Critères de sélection des phytos



Agroscope Transfer | N° 512 / Janvier 2024



Agroscope : une bonne alimentation, un environnement sain

Index phytosanitaire pour la viticulture 2024

Liste Vitiswiss pour les PER et le certificat

Auteur-es

Pierre-Henri Dubuis, Christian Linder, Aurélie Gfeller,
Patrik Kehrlí, Lina Egli-Künzler, Kathleen Mackie-Haas



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DFEF

Fongicides

IR 2026

	Noms commerciaux	N° W	BIO	ES	B	R	T	PU	N°	Firmes
A	Airone	W-7035	✱					2	15	Andermatt Biocontrol
	Alfil WG	W-7605						1	14	Stähler
	Alginure	W-7184						1	19	Andermatt Biocontrol
	Alial 80 WG	W-6754						1	14	Stähler
	Aliton*	W-6510-2						1	12	Omya
	Amaline Flow*	W-7464, W-7464-1		20 m		1 p		2	16	Stähler, Syngenta
	Amarel-Folpet DF*	W-5003		6 m		1 p		2	14	Stähler
	Amarel Kupfer DF*	W-5004		6 m		1 p		3	16	Stähler
	Arco*	W-7257		6 m		1 p		2	14	Omya
	Argolem	W-5497-1	✱					3	19	fenaco société coopérative - AGROLINE
	Armcarb*	W-6432	✱					1	14	Stähler
	Astor	W-5005		100 m		1 p		3	3	Syngenta
	Atollan S	W-6060-4		20 m		1 p		2	14	Stähler
	Auralis*	W-7232-1	✱					1	19	Syngenta
	Avatar	W-5218-2		20 m				2	9b	Stähler
	Averel*	W-7169-1		20 m				3	8	Omya
B	Bacchus*	W-4878						3	16	Leu+Gygax
	Bogard*	W-5056-1		6 m				1	2a	Leu+Gygax
	Booster *	W-6841-1						1	19	Leu+Gygax
	Bordeaux S*	W-2116-1	✱					2	15	Stähler
	Bordeauxbrühe-Bouillie bordelaise*	W-7065	✱					2	15	Schneider
	Botector	W-6919	✱					1	19	Andermatt Biocontrol
	Bouillie bordelaise WP*	W-7197	✱					2	15	Andermatt Biocontrol
	Bouillie bordelaise LG*	W-2116	✱					2	15	Leu+Gygax
C	Cantus	W-6150, W-6147						1	9d	Leu+Gygax, BASF
	Capito Bio-Schwefel*	W-18-2	✱					1	17	Stähler
	Celos*	W-6873	✱					1	17	Leu+Gygax
	CeraSulfur	W-7634	✱		6 m			2	17	Andermatt Biocontrol
	Champ Flow*	W-7450, W-6838	✱					1	15	Stähler
	Cidely*	W-6592-2						1	11	Syngenta
	Corsil*	W-5460-1		6 m				1	1	Omya
	Cupric flow*	W-2710-4	✱					2	15	Stähler
	Cupro-Folpet Ultra SC*	W-7613		6 m		1 p		3	16	Stähler
	Cuprofix 35	W-7018-4	✱					3	15	Syngenta
	Cuprofix Fluid*	W-6383-1	✱					2	15	Syngenta
	Cuproxat flüssig*	W-2710, W-7074	✱					2	15	Leu+Gygax
	Cuprum Flow*	W-6838-1, W-7450-1	✱					1	15	Schneider
	Curenox 50 WG*	W-6556	✱					3	15	Schneider
	Cyflamid*	W-6592-2						1	11	Stähler
	Cymbal	W-7484-2						2	14	Leu+Gygax
	Cyrano*	W-6219, W-6219-1		6 m		1 p		2	14	Bayer, Leu+Gygax, Syngenta
D	Delan Pro	W-7223		20 m		1 p		2	14	BASF
	Delan WG	W-6060, W-6060-3		20 m		1 p		2	14	BASF, Syngenta
	Difcor 250 EC*	W-6452		6 m				1	2a	Schneider
	Dithianon 70 WG	W-5417		20 m		1 p		2	14	Schneider

SVBN

Auxiliaires et parasitoïdes

Des acteurs importants (et discrets) dans vignoble

- Utilisation de produits phytosanitaires préservant les populations



Fongicides	N°	Typhlo- dromes	Parasi- toïdes	Antho- corides	Chry- sopes	Cocci- nelles	Syrphi- des	Abeilles	Organis. aquatiques
amétoctradine	7b	N	N		N				▲
amisulbrom	7a	N	N						▲
argiles sulfurées	19	N							
<i>Aureobasidium pullulans</i>	19	N	N	N	N	N	N		
azoxystrobine	1	N	N	N	N	N			▲
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	19	N	N	N	N	N	N		
benalaxyl	6	N	N					N	▲
benthiavalicarbe	16	N	N		N				▲
boscalid	9	N	N		N				
bouillie bordelaise	15	N	N						▲
bupimate + tébuconazole	2	N	N	N	N	N			▲
COS-OGA	19	N							
cuivre (+ divers produits)	15/16	N	N-M		N-M				▲
cyazofamide + phosphonate de disodium	7	N	N		N	N			▲
cyflufénamide	11	N	N		N				▲
cymoxanil	14	N	N		N				▲
cymoxanil + zoxamide	14	N	N		N				▲
cyprodinil + fludioxonil	9	N	N	N		N			▲
difénoconazole	2	N	N	N	N	N	N		▲
dithianon	14	N	N	N	N	N	N		▲
fenhexamide	9	N	N	N		N			▲
fenpropidine	3	N	N			N			▲
fenpyrazamine	9	N	N						▲
fluazinam	14	N	M	Mapro, Ibiza SC, Signal,					▲
fludioxonil	9	N	N	N		N			▲
fluopyram	2	N	N						▲
fluxapyroxad	5	N	N						▲

Polyram DF, Aviso



Espiro, Papyrus, Pyrus 400 SC





Habitations

Zones résidentielles et installations publiques (par ex.: parcs, jardins, installations sportives et de loisirs, aires de récréation, aires de jeux, écoles ou établissements de soins)

Tableau 2: points nécessaires pour réduire la largeur de la zone non traitée

Distance prescrite	3 m	6 m	20 m
Points nécessaires	Réduction de la largeur de la zone		
1 = 75 % réduction dérive	0 m ¹	3 m ¹	6 m

Produits concernés (exemples..)

Mélody Combi


Flint

Escort

Ampexio

...

Avertissement passants



Produits concernés (exemples..)

Mélody Combi

Escort

...

7. Les travaux successifs dans les cultures traitées sont possibles au plus tôt 48 heures après l'application. Il faut alors porter des gants de protection + une tenue de protection (au minimum une chemise à manches longues + des pantalons).
8. Information pour que des tierces personnes n'entrent pas dans la parcelle.


Eaux



CAS FONGICIDES

SANS MENTION SPE3

		ES	B	R	PU
L	Legan WG	20 m		1 p	2
	Leimay*	20 m			1
	Lumino*	6 m			1
M	Magma triple*	6 m		1 p	3
	Mapro	50 m		3 p	3
	Melody Combi*	6 m		1 p	2
	Microthiol LG	6 m			2
	Microthiol Spécial Dispers*	*			1
	Mikal*	6 m		1 p	2
	Mildicut*				1
	Moon Experience*	20 m			2
	Myco-sin	*			3
N	Netzschwefel Stulln*	*			1



0 m

3 m

6 m

COURS D'EAU

		ES	B	R	PU
L	Legan WG	20 m		1 p	②
	Leimay*	20 m			①
	Lumino*	6 m			①
M	Magma triple*	6 m		1 p	③
	Mapro	50 m		3 p	③
	Melody Combi*	6 m		1 p	②
	Microthiol LG				②
	Microthiol Spécial Disperss*	✱			①
	Mikal*	6 m		1 p	②
	Mildicut*				①
	Moon Experience*	20 m			②
	Myco-sin	✱			③
	Netzschwefel Stulln*	✱			①


Exception
viticole

Points ruissellement

	Noms commerciaux	BIO	ES	B	R	PU
I	Ibiza SC		50 m		3 p	②
K	Kocide Opti*	✱				③
	Kocide 2000*	✱				②
	Kumulus WG	✱				①

Points ruissellement

	Noms commerciaux	BIO	ES	B	R	PU
I	Ibiza SC		50 m		3 p	2
K	Kocide Opti*	✱				3
	Kocide 2000*	✱				2
	Kumulus WG	✱				1



3 points nécessaires pour limiter le ruissellement

Produits concernés (exemples..)

Chikara

Flint

Amarel Folpet

Folpet

Risque utilisateur

Indications relatives aux risques:

- H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H361d Susceptible de nuire au fœtus.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer

GHS08



Dangereux pour la santé



Les femmes enceintes ou qui allaitent et les jeunes travailleurs ne doivent utiliser les PPh que de manière restreinte, voire pas du tout. Veuillez à ce sujet observer les données du chapitre 15 des fiches de données de sécurité.

Produits concernés (exemples..)

Topas vino

Fezan

...

Effacité?

Note technique 2026 sur les résistances aux maladies

Par Institut Français de la Vigne et du Vin

Publié le 12 janvier 2026



[Vers la note technique](#)

Note technique 2026 sur les résistances aux maladies

Par Institut Français de la Vigne et du Vin
Publié le 12 janvier 2026



Black-rot

Botrytis

Excoriose

Mildiou

6 Phénylamides (FRAC-code: 4; maximum 3 applications/année, au plus tard à fin juillet)

Ridomil Vino*	WG	c/s	métalaxyl M (4) + folpet (M04)		5 + 40	0.225		●		●
Fantic F	WG	c/s	bénalaxyl M (4)+ folpet (M04)		3.75 + 48	0.2		●		●
Cyrano*, Magma Triple* (recommandé max 4x/an)	WG	c/s/p	folpet (M04) + cymoxanil (27) + fosétyl-Al (P07) ne pas mélanger au Cu		50 + 4 + 25	0.2 hélico: 0.25	●	●		●
Cymbal (uniquement en mélange avec du folpet 0.1%, cymoxanil: max. 4x/an)	WG	c/p	cymoxanil (27)		45	0.016				●

Produits à base de cyanooximes

cymoxanil	Résistance spécifique. <i>Unisite avec mécanisme de résistance inconnu.</i> Facteurs de résistance élevés.	Données anciennes.	Efficacité souvent insuffisante.
-----------	---	--------------------	----------------------------------

Produits à base d'anilides

bénalaxyl-M métalaxyl-M	Résistance spécifique. <i>Modification de la cible (ARN Pol I / mutation inconnue).</i> Facteurs de résistance élevés.	Peu de données Occurrence et fréquence fortes constatées en fin de campagne	Efficacité souvent insuffisante.
----------------------------	---	--	----------------------------------

Travaux successifs



Les gants de type GR ont les doigts et la paume enduits de Nitrile, tandis que le dos est en tissu respirant.

Produits concernés (exemples..)

Flint

Pergado

Cyrano

Folpet

Mapro

Prosper

... .. (x10)

Cultures spéciales

Protection de l'utilisateur	Symbole	Préparation de la bouillie	Application (ou une cabine fermée)	Travaux successifs
Niveau 1	●	  	 	
Niveau 2	●	  	   	 
Niveau 3	●	Voir la notice d'information du produit		

Stratégie anti-résidus

- Matières actives et **traces** retrouvées (N = 31)

Matière active	Nombre >LOQ	
Phthalimide	195	72.5%
Acide phosphoreux	177	98.3%
Fenpropidine	73	27.1%
Mandipropamide	69	25.7%
Fosetyl-Aluminium	63	23.4%
Iprovalicarb	61	22.7%
Fludioxonil	56	20.8%
Boscalid	55	20.4%
Fenhexamide	53	19.7%
Cyprodinil	26	9.7%
Métalaxyl	22	8.2%
Fenpyrazamine	15	5.6%
Spiroxamine	15	5.6%
Azoxystrobine	14	5.2%
Pyrimethanil	13	4.8%
Diméthomorphe	10	3.7%
Fluopicolide	10	3.7%

Matière active	Nombre >LOQ	
Métrafénone	9	3.3%
Trifloxystrobine	9	3.3%
Myclobutanil	7	2.6%
Fluxapyroxad	5	1.9%
Thiophanate-methyl	4	1.5%
Cymoxanil	3	1.1%
Fluopyram	3	1.1%
Zoxamide	3	1.1%
Amisulbrom	1	0.4%
Carbendazime	1	0.4%
Cyflufenamid	1	0.4%
Kresoxim-methyl	1	0.4%
Tébuconazole	1	0.4%
Valifenalate	1	0.4%



- anti-mildiou (15)
- anti-oïdium (8)
- anti-Botrytis (8)

Principaux concernés (exemples..)

Anti-botrytis (de manière générale)

Astor

Folpet

Pergado, Ampexio

Mélody combi ...

SVBN	oui	Non
Eaux	6	20
Habitations	-	6
Avertissements	non	Oui
Points ruissellement ?	-	-
Fonctionnement produit	pénétrant	contact
Efficacité?	résistances	Bon
Stade d'application	Pré et post floral	Pré et post floral
Risque utilisateur	-	-
Travaux successifs	48h	48 h
Stratégie anti-résidus		
...???		



 basephyto

Annuler




BasePhyto
Productivité

Obtenir

DEEProd SA

Productivité



Genèse BasePhyto



BasePhyto
Productivité

Projet initié en 2020 par un groupe de travail vaudois réunissant les organes de conseil viticoles, arboricoles, maraichers et des grandes cultures, les institutions scientifiques et porteuses de références agronomiques ainsi que par le Canton de Vaud qui a financé le projet durant 4 ans



**Mode de production:**

- ☐ BIO fédéral ☐ BIO FiBL
☒ PER ☐ SVBN

Domaines d'activités:

Viticulture (W)

Efficacité:

- ☒ 4 bonne ☐ 3 suffisante ☐ 2 partielle

Filtres:

Culture (Vignes) 1 0 ▾

Adventices 60 0 ▾

Maladie 7 0 ▾

Ravageurs 15 0 ▾

**Filtres:**

Culture (Vignes) 1 0 ▾

Adventices 59 0 ▾

Maladie 7 1 ▲

☐ Botrytis

☐ Coïtre

☐ Excoriose

☐ Mildiou

☒ Oïdium

☐ Rougeot

Ravageurs 15 0 ▾

N°	Dénomination commerciale	Dosage / Concentration	Substance	Groupe de résistance	Firme	Bio / PER			Prot. utilisateur			Dérive				Risque env.		
						BIO fédéral	BIO FIBL	PER	Préparation	Application	Retour	Public	Biotopes	Eau	Fleur	Abeilles	Ruissellement	Max eau et sol
W-7035	Airone	Dosage: 2.72 kg/ha Concentration: 0.17%	cuivre (sous forme d'hydroxyde) cuivre (sous forme d'hydroxyde) cuivre (sous forme d'oxychlorure) cuivre (sous forme d'oxychlorure)	M01 +M01	An	Oui	Oui	Oui	M:P3	GT (A)	48h GT							4k cu/
W-6510-2	Aliton	Dosage: 0.16 - 0.32 l/ha Concentration: 0.02%	métrafénone	50	Om	Non	Non	Oui										
W-5497-1	Argolem	Concentration: 0.5%	Sulfate d'aluminium acide sulfurique sur terre argileuse extrait de prêle		Fe	Oui	Oui	Oui	VM:P3	GTM: P3 (A)	48h GT							
W-6432	Armicarb	Dosage: 3.2 kg/ha Concentration: 0.2%	Hydrogogénocarbonate de potassium		St	Oui	Oui	Oui										
W-6432	Armicarb	Dosage: 3.2 kg/ha Concentration: 0.2%	Hydrogogénocarbonate de potassium		St	Oui	Oui	Oui										
W-5005	Astor	Dosage: 0.4 l/ha Concentration: 0.025%	fenpropidine	5	Sy	Non	Non	Oui	VM:A 2	GT (A)	48h GT			E100m			1pt	

Dérive	Risque env.
Biotopes ▼	Eau ▼

Eau

☐ (Sélectionner tout)
☐ (Vides)
☐ E100m
☐ E20m
☐ E50m
☐ E6m

Appliquer

Effacer

Dérive		Risque env.
Public	Biotopes	Eau

Public

☐ (Sélectionner tout)
☐ (Vides)
☐ P6m
☐ P6m, Info

Appliquer

Effacer

[illegible]

	N°	Dénomination commerciale	Préparation	Application	Retour	Public	Biotopes	Eau	Fleur	Abeilles	Ruissellement
☐	W-7404-2	Prox	V	GTV (A)	48h GT			E50m			4pt
☐	W-7404-2	Prox	V	GTV (A)	48h GT			E50m			4pt
☐	W-7404-1	Spirox	V	GTV (A)	48h GT			E50m			4pt
☐	W-7404-1	Spirox	V	GTV (A)	48h GT			E50m			4pt
☐	W-6601	Ibiza SC		GTV (A)	48h GT			E50m			3pt
☐	W-6782	Mapro	M:P3	GTV (A)	48h G			E50m			3pt
☐	D-3844	Shirlan	V	GTV (A)	48h GT			E50m			3pt
☐	W-6601-1	Torga		GTV (A)	48h GT			E50m			3pt
☐	W-6747	Zignal	V	GTV (A)	48h GT			E50m			3pt
☐	W-5934	Prosper	V	GTV	48h			E50m			3pt

Affichage des colonnes

Visibilité

- ☒ N°
- ☒ Dénomination commerciale
- ☒ Dosage / Concentration
- ☒ Substance
- ☒ Groupe de résistance
- ☒ Firme
- ☒ Bio / PER
- ☒ BIO fédéral
- ☒ BIO FiBL
- ☒ PER
- ☒ Prot. utilisateur
- ☒ Préparation
- ☒ Application
- ☒ Retour
- ☒ Dérive
- ☒ Public
- ☒ Biotopes
- ☒ Eau
- ☒ Fleur
- ☒ Risque env.
- ☒ Abeilles

Tout afficher

Figer

- ☒
- ☒
- ☐
- ☐



N°

Dénomination commerciale

Dosage / Concentration

Substance



W-7035

Airone

Dosage: 2.72 kg/ha
Concentration: 0.17%

cuivre (sous
d'hydroxyde
cuivre (sous
d'hydroxyde
cuivre (sous
d'oxychloru
cuivre (sous
d'oxychloru



W-6510-2

Aliton

Dosage: 0.16 - 0.32 l/ha
Concentration: 0.02%

métrafénon



W-5497-1

Argolem

Concentration: 0.5%

Sulfate d'al
acide sulfur
terre argileu
extrait de p



W-6432

Armcarb

Dosage: 3.2 kg/ha
Concentration: 0.2%

Hydrogogén
ate de potas



W-6432

Armcarb

Dosage: 3.2 kg/ha
Concentration: 0.2%

Hydrogogén
ate de potas



W-5005

Astor

Dosage: 0.4 l/ha
Concentration: 0.025%

fenpropidin



W-7232-1

Auralis

Dosage: 2 l/ha
Concentration: 0.125%

COS-OGA




W-5050-1

Recon

Concentration: 0.0125%

l'if



BasePhyto


Choisissez vos options:

Chercher
des moyens de lutte

Consulter
un produit

Favoris
consulter

Outils
Utilitaires



Historique

Liste de vos recherches:

Aucun historique de recherche

Outils & Liens

Général

Inscription au permis de traiter [permis-pph](#)

Données et prévisions météorologiques [Agrométéo](#)

Connaissances des adventices et méthodes de
désherbage [Infloweb](#) , [Iriis](#)

Connaissance des maladies et ravageurs et
méthodes de lutte [Agrifind](#) , [Ephytia](#) , [Iriis](#)

Index des produits phytosanitaires [OSAV](#)

Informations sur les bonnes pratiques [Bonnes
pratiques agricoles](#)

Mesures de protection de l'utilisateur [Toolkit](#)

Effet des produits phytosanitaires sur les
pollinisateurs [Toxibeets](#)

Carte des risques de ruissellement et des cours d'eau
[geo.admin](#)

Cartes des zones de protection de l'eau souterraine
[OFEV](#)

Carte des biotopes [Vaud](#)

Réduction de la dérive et du ruissellement
[SPP](#) , [Agridea](#) , [Evaluation du risque à la parcelle](#)

Viticulture

Guide Agroscope [Viticulture](#)

Dosage adapté au volume foliaire en viticulture
[Agrométéo](#)

Modèle de prévision des maladies
[Agrométéo](#) , [rimpro](#)



W-6432 Armicarb

Substance(s) active(s):

Hydrogogénocarbonate de potassium

Teneur:

85%

Code de formulation:

SP poudre soluble dans l'eau

Culture:

vigne

Organismes nuisibles / Utilisation:

● oïdium de la vigne

Dosage:

3.2 kg/ha

Concentration:

0.2%

Application:

traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard.

Prix indicatif /l:

20 CHF

[Charges](#)

BasePhyto

[Auxiliaires](#)

Application

Stade

<mi-août

Précisions

aérien, Dosage adapté au volume (base 1600l/ha à BBCH 71-81)

Adjonction

soufre

DISCLAIMER – BasePhyto

Les données et recommandations fournies par cette application sont informatives et non garanties. Elles ne constituent pas un conseil professionnel. Toute décision prise sur la base de ces informations relève exclusivement de votre responsabilité. Proconseil Sàrl décline toute responsabilité en cas de dommage ou perte résultant de l'utilisation du Service.



W-6432 Armicarb

Substance(s) active(s):

Hydrogogénocarbonate de potassium

Teneur:

85%

Code de formulation:

SP poudre soluble dans l'eau

Culture:

vigne

Organismes nuisibles / Utilisation:

☒ oïdium de la vigne

Dosage:

3.2 kg/ha

Concentration:

0.2%

Application:

traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard.

Prix indicatif /l:

20 CHF

Charges

BasePhyto

Auxiliaires

	Typhodromes	Parasitoides	Anthocoride	Chrysopes	Coccinelle	Syrphides	Abeilles	Aquatique
Hydrogogénocarbonate de potassium	N	N	N					

DISCLAIMER – BasePhyto

Les données et recommandations fournies par cette application sont informatives et non garanties. Elles ne constituent pas un conseil professionnel. Toute décision prise sur la base de ces informations relève exclusivement de votre responsabilité. Proconseil Sàrl décline toute responsabilité en cas de dommage ou perte résultant de l'utilisation du Service.



W-6432 Armicarb

Substance(s) active(s):

Hydrogogénocarbonate de potassium

Teneur:

85%

Code de formulation:

SP poudre soluble dans l'eau

Culture:

vigne

Organismes nuisibles / Utilisation:

☒ oïdium de la vigne

Dosage:

3.2 kg/ha

Concentration:

0.2%

Application:

traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard.

Prix indicatif /l:

20 CHF

Charges

BasePhyto

Auxiliaires

Charges et remarques:

- Convient également au traitement par voie aérienne.
- Uniquement en mélange avec du soufre mouillable 80% (0.2%, 3.2 kg/ha).
- Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume de la haie foliaire.

Indications relatives à la sécurité:

- SPe 2 Tenir hors de portée des enfants.
- SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPe 2 Autorisé pour l'utilisation non professionnelle.

Indications relatives aux risques:

- EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



W-6432 - Armicarb

Dénomination

Valeur

Alerte-vigilance

Ne pas mélanger avec plus de 250 g Cu/ha et ne pas mélanger avec un cuivre liquide.

BIO fédéral

Oui

BIO FIBI

Oui

Mélanges obligatoires

Uniquement en mélange avec du soufre.

PER



Oui

Remarques

Uniquement en mélange avec du soufre mouillable 0.2%

SVBN

Oui

DISCLAIMER – BasePhyto

Les données et recommandations fournies par cette application sont informatives et non garanties. Elles ne constituent pas un conseil professionnel. Toute décision prise sur la base de ces informations relève exclusivement de votre responsabilité. Proconseil Sàrl décline toute responsabilité en cas de dommage ou perte résultant de l'utilisation du Service.